

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

12 NF

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)

C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

DLP 18-2-63 185052

Supplément N° I au Bulletin Technique N° 8 de Mai 1961

AVERTISSEMENTS

VIGNE

Mildiou : Les premières taches viennent d'apparaître. Elles sont encore peu nombreuses et intéressent surtout les feuilles se trouvant près du sol.

Nous conseillons donc un premier traitement général qui devrait être appliqué dès réception de cette note. Traiter aussi soigneusement les jeunes plantations.

Supprimer les pousses basses pour éviter de nouvelles contaminations.

Black-Rot : Le traitement ci-dessus sera également efficace contre le Black-Rot.

Vers de la grappe : Si le traitement préconisé dans notre précédent avis n'est pas encore fait, il convient de l'effectuer sans retard.

ARBRES FRUITIERS

Carpocapse des Poires et des Pommes : Les captures de papillons de Carpacapse sont observées depuis plusieurs jours déjà.

Pour éviter les premières attaques, un traitement insecticide devrait être prévu dès à présent.

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Les arboriculteurs qui n'auraient pu faire le traitement indiqué dans notre note du 29 avril, pourraient mélanger le produit fongicide à la bouillie insecticide conseillée contre le carpocapse.

INFORMATIONS

VIGNE

Botrytis : Sur de nombreuses feuilles on observe l'apparition de taches desséchées qui gagnent vers le milieu du limbe. Ces lésions peuvent être dues à une attaque de Botrytis (Pourriture grise) qui provoque une sorte de grillure.

Le développement du parasite est favorisé par l'atmosphère humide et fraîche du mois d'avril. Le retour à des conditions climatiques normales devrait arrêter les dégâts.

Glandes perlées : Il ne faut pas confondre les exsudations en forme de gouttelettes brillantes qui apparaissent sur les feuilles et les jeunes rameaux avec les oeufs d'insectes. Ces glandes perlées sont visibles au moment où la végétation est active.

.../...

ARBRES FRUITIERS

Rouille du Prunier : Pour prévenir les attaques de la Rouille du Prunier appliquer dès à présent une Bouillie bordelaise à 1% ou encore une spécialité à base de Zinèbe ou de Zirame.

POMMES de TERRE

Mildiou : Les premiers foyers viennent d'apparaître dans les cultures de Primeurs.

Pour protéger les cultures, un nouveau traitement devrait être effectué dès réception de cette note.

Bordeaux, le 9 mai 1961

Le Contrôleur
chargé des Avertissements
C. ROUSSEL

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux
J. BRUNETEAU

x

x x

LES SERVICES D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS(Directions du Lot et Garonne, de la Dordogne, et de la Gironde) communiquent :

Le Mildiou est apparu sur un semis de Tabac de la commune de St-Georges, (canton de Tournon d'Agenais dans le Lot et Garonne). Tous les planteurs doivent redoubler de vigilance.

Matin et soir, visiter les semis et vérifier s'il n'y a aucun duvet grisâtre sur les faces inférieures des feuilles.

Eclaircir les semis trop épais.

Effectuer les traitements prescrits avec le plus grand soin et la plus grande régularité.

Répéter les traitements après une pluie.

Alerter immédiatement le Chef de Secteur ou l'animateur de chaque groupe de défense si un semis paraît suspect.

Un autre foyer est signalé dans la Vienne et une extension est possible dans les Charentes.

Nous insistons sur la nécessité d'exercer une vigilance accrue et d'effectuer les traitements prescrits.